	INDICACIONES POSTERIORES A LA APLICACIÓN DE RELLENO CON ÁCIDO HIALURÓNICO	CÓDIGO: FO-CE-046
		VERSIÓN: 01
		FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE/2016
		PÁGINAS: 1/1

INDICACIONES POSTERIORES A LA APLICACIÓN DE RELLENO CON ÁCIDO HIALURÓNICO

La aplicación de material de relleno con ácido hialurónico es un procedimiento seguro, que en manos expertas puede producir resultados de rejuvenecimiento y sustitución de volumen de forma armónica y natural, sin embargo, al ser un procedimiento inyectable, puede estar asociado a algunas complicaciones. Cuando éstas ocurren, son fáciles de resolver y su duración es limitada.

Algunas de las complicaciones descritas son:

- **Enrojecimiento, dolor o aparición de equimosis**

Inmediatamente después del procedimiento es común que ocurra enrojecimiento, hinchazón o aparición de “morado” (equimosis) en el sitio de aplicación. Tanto el enrojecimiento como la hinchazón se presentan debido a la inflamación por la inyección y/o uso de una cánula, como también podría ser por las propiedades del producto. El enrojecimiento mejora en algunas horas, mientras que la hinchazón puede persistir de 2 a 3 días. En caso de aparición de equimosis, éstas pueden durar de 5 a 10 días.


Es importante mencionar que ninguna de estas complicaciones inmediatas afectarán el resultado cosmético final.

- **Dolor y nodularidad**

Puede presentarse sensibilidad aumentada y dolor en el área de aplicación, así como pápulas o nódulos palpables (no visibles) en el sitio donde fue puesto el producto, lo cual tiende a disminuir o desaparecer en aproximadamente de 1 a 2 meses. El producto podrá ser masajeado por el propio paciente sin riesgo de producir migración del producto.

- **Infección**

La aparición de infección en el sitio de aplicación es un evento inusual. En caso de presentar dolor persistente, enrojecimiento días posteriores a la aplicación

	INDICACIONES POSTERIORES A LA APLICACIÓN DE RELLENO CON ÁCIDO HIALURÓNICO	CÓDIGO: FO-CE-046
		VERSIÓN: 01
		FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE/2016
		PÁGINAS: 2/1

del material, supuración o fiebre, por favor avise a la clínica y/o a su médico tratante.

Algunas observaciones a tenerse en cuenta:

- No es necesario tener reposo absoluto después de la aplicación inmediata del producto, ni en los días posteriores al procedimiento.
- Evite el consumo de alcohol y de actividad física intensa, por lo menos tres días después del procedimiento.
- Evite la realización de procedimientos odontológicos, exposición solar aguda y/o exposición a altas temperaturas 15 días posteriores al procedimiento.

Cualquier duda que este instructivo no le resuelva, por favor comuníquese con nosotros al número **(+574) 444 35 37** o en el celular **(+57) 305 291 22 87** en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.