

	RECOMENDACIONES POSTERIORES A LA TERAPIA FOTODINÁMICA	CÓDIGO: FO-PRO-038
		VERSIÓN: 01
		FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO/2015
		PÁGINAS: 1/2

El seguir las recomendaciones posteriores al procedimiento, le permitirá conocer los cambios normales que presentará su piel después del procedimiento, tales como: **dolor, enrojecimiento, formación de ampollas, costras, cambios en el color de la piel**, entre otros. Por estas razones le recomendamos tener en cuenta lo siguiente:

1. DOLOR Y ARDOR

Posterior a la realización del procedimiento de terapia fotodinámica, puede presentar sensación de dolor o ardor. Estos síntomas pueden controlarse tomando acetaminofén de 500mg. La mayoría de los pacientes refieren que este dolor es pasajero (1 a 2 días), y no muy intenso.

2. ENROJECIMIENTO E INFLAMACIÓN

Es común la aparición de enrojecimiento e inflamación en la(s) zonas(s) donde se realizó la terapia fotodinámica. Este enrojecimiento puede durar algunos días. **Es importante que usted proteja su piel de la exposición solar por un lapso de 48 a 72 horas**, ya que su piel puede quedar temporalmente más sensible a la radiación ultravioleta y quemarse con facilidad.

3. FORMACIÓN DE AMPOLLAS

En ocasiones pueden aparecer ampollas flácidas durante la primera semana después de la realización del procedimiento, que de referencia, no deben retirarse. Muchas de estas ampollas terminan espontáneamente rompiéndose y dejando una zona con costras.

4. FORMACIÓN DE COSTRAS

Con frecuencia, días después de la realización de la terapia fotodinámica, pueden aparecer costras fijas de color café o amarillento, en los sitios tratados. Éstas no deben retirarse voluntariamente, sino por medio de la humectación con una crema que le formule el médico después del procedimiento. Así, dichas costras irán cayendo de forma espontánea. En caso de aparecer una costra de color negro y fija, en el sitio donde fue tratado, debe consultar de inmediato a su médico, pues puede ser una señal de necrosis o sufrimiento de la piel por el tratamiento recibido. La aparición de necrosis posterior a la terapia fotodinámica, **no es común**.

	RECOMENDACIONES POSTERIORES A LA TERAPIA FOTODINÁMICA	CÓDIGO: FO-PRO-038
		VERSIÓN: 01
		FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO/2015
		PÁGINAS: 2/2

5. CAMBIOS EN EL COLOR DE LA PIEL

Posterior a la caída de las costras, que en general es en la tercera o cuarta semana después de haber realizado el procedimiento, puede quedar con enrojecimiento la piel que se trató, por algunas semanas o meses. En algunos pacientes puede presentarse oscurecimiento del área tratada (hiperpigmentación pos inflamatoria), o por el contrario, despigmentación (blanqueamiento) del área tratada. Usualmente, los cambios en el color de la piel suelen ser temporales (semanas a meses).

6. SIGNOS DE ALARMA

Si pasados días posteriores al procedimiento, usted tiene fiebre (identificada con un termómetro), escalofríos, enrojecimiento y calor en el sitio de la herida, o salida de material purulento, por favor comuníquese con nosotros al (+574) 444 35 37 en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

En caso de que usted considere que se trata de una emergencia, debe acudir al servicio de urgencias más cercano.

7. SEGUIMIENTO

Generalmente, el médico que le realizó la terapia fotodinámica, lo revisará al mes de finalizar todo el proceso que ésta conlleva. Recuerde que dependiendo la lesión que se vaya a tratar, el médico podrá repetir el mismo procedimiento semanas posteriores.

Por favor reporte cualquier evento adverso, incidente o complicación, a través de cualquiera de los siguientes medios:

1. Página web www.clinicaaurora.com.co en el menú Contáctenos - Reporte aquí.
2. Llamando al teléfono (+574) 444 35 37 extensiones 106 y 112.
3. Directamente con el personal de la institución.